



Sint Maartenskliniek

## Vastzetten nekwervels - via de achterkant

Bij een dorsale cervicale spondylodese zet de chirurg uw nekwervels aan elkaar vast

### Waarom?

Iedereen heeft zeven nekwervels. Deze zijn met behulp van tussenwervelschijven en bandstructuren met elkaar verbonden. Tussen de wervels loopt het ruggenmerg en vanuit het ruggenmerg lopen zenuwen naar de armen. Wanneer er sprake is van slijtage van de nekwervels en/of tussenwervelschijven door artrose, een ongeval of reuma, kan de stand van de wervels veranderen. Soms verandert de stand dusdanig, dat de zenuwen of het ruggenmerg tussen de wervels in de knel komen te zitten. Dit kan leiden tot pijnklachten van de nek met eventueel uitstralende pijn in de armen. Om deze pijnklachten te verminderen of zelfs weg te nemen moeten de zenuwen en het ruggenmerg vrij gelegd worden. Daarvoor is het noodzakelijk botweefsel weg te nemen. Ook kan het zo zijn dat het ruggenmergkanaal vernauwd is. De chirurg zal dan besluiten om meer ruimte te maken in het kanaal.

### Waar moet u zijn?

De Sint Maartenskliniek probeert haar zorg zo dicht mogelijk bij uw woonplaats te organiseren. Sommige behandelingen, zoals operaties, worden echter slechts op een paar locaties uitgevoerd. Het kan daarom zijn dat niet het gehele traject van uw behandeling op dezelfde locatie van de Sint Maartenskliniek plaatsvindt. De voorbereiding en nazorg kunnen bijvoorbeeld ergens anders zijn dan de operatie. In het bericht dat u van ons ontvangt, melden we altijd de locatie waar u verwacht wordt.